

VACUNA COMIRNATY (Pfizer-BioNTech)

PODRÍAN VACUNARSE

Ante la falta actual de evidencia:

- **PERSONAS INMUNOCOMPROMETIDAS:**

La vacuna se considera igual de segura que en el resto de población aunque la respuesta inmune puede ser inferior.

- **EMBARAZADAS:** no hay evidencia suficiente para recomendar su uso durante el embarazo.

En términos generales, debe posponerse la vacunación de embarazadas hasta el final de la gestación salvo casos concretos que se han de valorar.

Si se produce una vacunación en un embarazo inadvertido, debe comunicarlo al profesional sanitario de referencia.

Al tratarse de vacunas de ARNm y no de virus atenuados, no se considera que supongan un riesgo para el lactante. Puede recibir la vacuna una madre que amamanta y que forma parte de un grupo en el que se recomienda la vacunación.



Fuente: Jenifer Marcos
(enfermera de Neumología del Hospital
Ntra. Sra. de Sonsoles, de Ávila)

PUEDEN VACUNARSE

- ✓ Historia de alergias alimentarias, a animales, insectos, venenos, alérgenos ambientales, látex u otras alergias no relacionadas con vacunas o tratamientos inyectables.
- ✓ Historia de alergias a medicamentos (incluyendo el equivalente oral de un medicamento inyectable)
- ✓ Alergia no grave a otras vacunas o medicamentos (por ejemplo, reacciones no anafilácticas)
- ✓ Historia familiar de anafilaxia
- ✓ Algún otro antecedente de anafilaxia no relacionada con vacunas o tratamientos inyectables

ACTUACIÓN

- Observación del paciente durante al menos 30 minutos postvacunación a las personas con antecedentes de reacciones alérgicas graves (por ejemplo, anafilaxia) por cualquier causa.
- Observación del paciente durante al menos 15 minutos a las personas con antecedentes de reacciones alérgicas no anafilácticas.

ATENCIÓN: TODA LA INFORMACIÓN VA REFERIDA A PACIENTE MAYOR DE 16 AÑOS

No se dispone aún de datos consistentes de seguridad e inmunogenicidad en menores de 16 años.

PRECAUCIÓN EN:

En enfermedad aguda moderada o grave:

- Evaluar el riesgo
- Valorar posponer la vacunación
- Si se decide vacunación: observación del paciente durante al menos 30 minutos postvacunación

VACUNACIÓN CONTRAINDICADA

Historia de reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) a algún componente de la vacuna COMIRNATY o a la dosis previa.

POSTPONER VACUNACIÓN

Personas con síntomas sospechosos de COVID-19 o con COVID-19 confirmada hasta que estén completamente recuperadas y haya finalizado aislamiento.

Personas en cuarentena por ser contactos de un caso confirmado. Excepto en centros residenciales

Información extraída de: **Guía Técnica. COMIRNATY (Vacuna COVID-19 ARNm, Pfizer-BioNTech)**

Disponible en: <https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/vacunaciones/vacuna-covid-19>